

O que devo saber sobre Xarelto?

- ◆ Xarelto torna o seu sangue mais fluido, o que previne de ter coágulos de sangue perigosos.
- ◆ Xarelto deve ser tomado exatamente como indicado pelo médico. Para garantir uma ótima proteção contra os coágulos de sangue, **nunca salte uma dose**.
- ◆ Não deve parar de dar/tomar Xarelto sem falar primeiro com o médico dado que o risco de coágulos de sangue pode aumentar.
- ◆ Fale com o profissional de saúde se estiver a tomar ou se a criança

sob o seu cuidado, tiver tomado recentemente ou se vier a tomar quaisquer outros medicamentos, antes de tomar Xarelto.

- ◆ Fale com o profissional de saúde que está a tomar/ou que a criança está a tomar Xarelto antes de qualquer cirurgia ou procedimento invasivo.

Quando é que devo consultar o meu profissional de saúde?

Quando estiver a tomar um fluidificante como Xarelto é importante que conheça os efeitos secundários possíveis. A hemorragia

é o efeito secundário mais frequente. Se sabe que tem um risco de hemorragia não comece a tomar ou a dar à criança Xarelto sem falar primeiro com o seu médico. Informe imediatamente o profissional de saúde se tiver/se a criança tiver quaisquer sinais ou sintomas de hemorragia como os seguintes:

- ◆ dor
- ◆ inchaço ou desconforto
- ◆ dores de cabeça, tonturas ou fraqueza
- ◆ nódoas negras involuáres, hemorragia nasal, hemorragia das gengivas, cortes que demoram muito tempo a parar a hemorragia
- ◆ fluxo menstrual ou hemorragia vaginal que é mais intensa que o normal

- ◆ sangue na urina que pode ser cor-de-rosa ou castanho, fezes vermelhas ou negras
- ◆ tosse com sangue ou vômito de sangue ou de uma substância semelhante a borras de café

Como devo dar Xarelto à criança/Como é que tomo Xarelto?

- ◆ Para garantir uma ótima proteção, Xarelto 1 mg/ml tem de ser dado/tomado com a amamentação (leite materno ou leite artificial) ou com as refeições.

Pode ser administrado através de uma sonda nasogástrica ou uma sonda de alimentação gástrica.

88053575 PT

Cartão de alerta do doente



Xarelto® 1 mg/ml
granulado para
suspensão oral

Informação para cuidadores/doentes:

- ◆ **Conserve sempre consigo este cartão**
- ◆ **Mostre este cartão a todos os médicos ou médicos dentistas antes do tratamento do doente.**

Veja o vídeo educacional que mostra como preparar e administrar a suspensão oral.



go.bayer.com/junior

O doente que está sob tratamento anticoagulante com Xarelto (rivaroxabano)

Nome: _____	Outros medicamentos / condições: _____
Morada: _____	_____
_____	_____
_____	_____
Data de nascimento: _____	Peso: _____
_____	_____

Em caso de emergência, notifique:

Nome do médico: _____

Telefone do médico: _____

Carimbo do médico: _____

Notifique também:

Nome: _____

Telefone: _____

Parentesco: _____

Informação para os profissionais de saúde:

- ◆ Os valores de INR não devem ser utilizados uma vez que não são uma medida fiável da atividade anticoagulante do Xarelto.

